

# 鼠疫



鼠疫是一種非常嚴重的疾病，是由偶爾在老鼠、松鼠、其他齧齒動物及其身上的跳蚤攜帶的細菌引起的。鼠疫分為：腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。

## 腺鼠疫（最常見）

鼠疫是怎樣感染的？	以下是可能感染腺鼠疫的情況： <ul style="list-style-type: none"><li>• 被感染的齧齒動物或跳蚤叮咬，或</li><li>• 病菌進入開放性傷口或切口。</li></ul>
鼠疫危險嗎？	危險。如果不及時治療，可導致死亡。
鼠疫會傳染嗎？	不會。人與人之間不會傳染腺鼠疫。
有哪些症狀？	潛伏期為2-6天： <ul style="list-style-type: none"><li>• 發燒</li><li>• 頭痛</li><li>• 寒顫，以及</li><li>• 無力</li><li>• 頸部、腋下或腹股溝的腺體腫脹並有觸痛感</li></ul> 隨後可能會感染另外一種稱為敗血性鼠疫的鼠疫。

## 肺鼠疫

鼠疫是怎樣感染的？	以下是可能感染肺鼠疫的情況： <ul style="list-style-type: none"><li>• 在感染人員或動物附近，或</li><li>• 吸入了恐怖分子釋放的煙霧或蒸汽。</li></ul>
鼠疫危險嗎？	危險。如果不及時治療，可導致死亡。曾在您附近的所有人都都需要治療。
鼠疫會傳染嗎？	會。您可能會因與患有肺鼠疫的患者接觸而感染。
有哪些症狀？	潛伏期為1-3天： <ul style="list-style-type: none"><li>• 發燒</li><li>• 頭痛</li><li>• 無力</li></ul> 您在幾天內可能會感染肺炎，而且： <ul style="list-style-type: none"><li>• 呼吸短促，</li><li>• 胸痛、咳嗽（有時伴有血絲或水狀黏液。）</li></ul> 隨後可能會感染另外一種稱為敗血性鼠疫的鼠疫。

## 敗血性鼠疫是怎樣感染的？

如果受感染的齧齒動物或跳蚤叮咬，就有可能感染敗血性鼠疫。也有可能是腺鼠疫或肺鼠疫的併發症。

敗血性鼠疫的症狀與腺鼠疫類似，但是另外伴有以下症狀：

- 腹痛，
- 休克，以及
- 皮膚下出現血結，類似瘀傷。

## 如果我認為自己感染了鼠疫怎麼辦？

立即打電話給醫生或醫院。您必須立即得到治療，否則可能會死亡。



## 更多資訊……

請致電 CDC (Centers for Disease Control) 獲得英語資訊：

800-CDC-INFO (800-232-4636)  
888-232-6348 (TTY)

或瀏覽：[www.bt.cdc.gov](http://www.bt.cdc.gov)  
[www.dhs.ca.gov/epo](http://www.dhs.ca.gov/epo)